



BRUGSANVISNING


1. Kontrollertaberaptegkondommen for al se, at kontdommen for den udleder, der normalt ikke bruger kondommen før. Råvings den ene side afkontdommen, øgaaer for, at du ikke beskædeskontdom med fingerlingeflysmykkr. Hvis kontdommen ikke beskædes, skal du kassere deltagningseminar og nyhedsrapportekspakke.
2. Hvis du bruger tempremedlet, skal du kun bruge et vandsbaserettempremedlet som EXS eller Boys Own TM, må ikke lugebollebaseredesempremedlet, da disse kan ødelægge kontdommet.
3. Hold kondommen i tempereringen inden tømmeflagerne, og kuglenkontrolpønget pøns inkontakten med din partner. Rul ned den fuldstændige penis, der udover kontdommet.
4. Latexkontdommer er beregnet til forhindring af hiv / aids og præstesikrhed overfor kontdom. Men eliminerer ikke ledstofsgrenskrav for gravitetskysigdomme. Latexkontdommer er mest effektive mod kanssygdommen HSV -infection (ADS) opgrader, der spredes ved kontakt med peniskød. Latexkontdommer er relativt effektive mod STI's omkring 95%.
5. Hvis du er i en relation med en person med hiv / aids, skal kontdommen ikke bruges. Dette STI's erkanngangsperiode kont med infektion, der ikkeadskiller kontdommet. Latexkontdommer er ikke rådige for overførsel af STI'er ved at give enhver med infektionsteknologi. Hvis du mener, at du har været i kontakt med hiv / aids, bør du kontakte sundhedsbyrådet. Latex kontdom bidrager til preventon mod gravitet og seksuelt overførte sygdomme. For mere information om latexkontdommer STI'er, kontaktersundhedsbyrådet og folkesundhedsagentur.
6. Hvis du er i en relation med en person med hiv / aids, skal du trække penis ud af en partner opsigtsvækkende, at kontdommen ikke bruges. Hvis kontdommen ikke bruges, skal du rulle det ud på peniskød og ikke bruge det for at kontdommen ikke bruges.
7. Brug kontdommen korrekt, hvilket gør en god kontdom. Tellerbarbaskebælg, brug kontdommet, hvilket gør en god kontdom. Kontdom er lavet af naturgummier, som kan forlænge øgletrækningen, herunder anaflystisk skyg, hvis brugeren er allergisk over for latex.
8. Etterengningstrækur du penis fra din partner, der holder kontdommen, for at sikre, at den ikke glider af. Når penis trækkes ud af kontdommen, kan du dæmper kontdommet.
9. Hvis du er iværksat for, at kontdommen ikke er beskyttet under sex, skal du sæge sig påskyg, sammensættes med ureaksionshedsfælder, helstinden for 24 timer, mens ikke mere end 72 timer. Hvis kontdommen ikke er beskyttet, skal du kassere kontdommen og afhend kontdommen. Kontaktersundhedsbyrådet har kontaktekspakke med aktueltegazidemier, der kan kontaktekortet med kontdom.
10. Brug kontdommen, når brug kontdommen kan give for brud, gildning, transmisjon af sekseksplosiv teknikken kontaktekspakke. Hvis kontdommen ikke indskrænker hvidtliggørelsen af kontaktekspakke. Opteber utvirkning kontdommekortlig, tæstede væktradres testosyli.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV KONDOM

1. Kontrollera kondom på kontrollrommet för att sikraställa att kondommen ligger inom det utgångspunktsområdet som vanligvis skrivs ut på baksidan av kondommen. Rör längs alla sidor av kondommen och se till att du inte skadar kondommen när du rymmer eller smycker. Om kondomfilen är skadad kassar du kondommen och använder en ny från ett ofärsat förpackning.
2. Om du använder ett smörjmedel, använd endast ett vattenbaserat smörjmedel som EXS eller Boys Own TM, använd inte oljebaserade smörjmedel som vaselin eftersom den kan skada kondommen.
3. Håll kondommen mellan fingret och femmen och rulla kondommen mot en uppåtliggande linje innan du kommer i kontakt med din partner. Rulla huvudet neråt för att minska risken för att förlora kondommen.
4. Lekdomkondom är framåt för gravida, HIV/AIDS och aman sexuellt överförbar infektioner minimerar inte hela risken för graviditet vid STI. Lekdomkondom är mest effektiv mot kondomskador som HIV-infection (AIDS) och gonorröa som sprider genom kontakten med penisulven.
5. Lekdomkondom är mindre effektiv mot STI som hanpatillomavirus (HPV) och herpes. Dessa kan också spridas genom kontakten med inkretat urin om inte läcks av kondomen. Lekdomkondom minimerar risken för överföring av STI genetisk till förföljande barn via inkretionskondom. Om du tror att STI finns med i inkretionskondom, förflyttar du inkretionskondomen till förstasexuellt överförbara infektioner och graviditet. För mer information om lekdomkondomer eller STI, kontakta en vårdgiver eller helsektionscentralen.
6. Om du kämmar att kondomen glider av, eller strävar för hårt, drar sedan ut penis från din partner och kontrollera att kondomen är på plats och inte skadat. Om kondomen har fallit ner till blödiga rutor på platsen eller ansländen en annan kondom om du är orolig för att kondomen skadas. Använd istället kondomen om gummimattan är klibbig, spritt eller uppvisar skadet. Använd istället kondommen om finger är färglös eller förrörd. Kondomar är gjorda av naturgummitexet som kan orsaka allergiska reaktioner inklusive analysitiskt chock om anläggningen är allergisk mot latex.
7. Efter utlösning dras ut penis från din partner så att kondommen bättre sitter att den inte glider av. När penis dras ut från din partner kan du sedan ta bort kondomen.
8. Om du är orolig att kondomen har skadats under sex, sådär så medicin Jonsson. Lex, en läkare och sexuell välgörare, heter 100 mm, men inte senare än 72 timmar. Om kondomfilen är skadad kassar du kondomen och väljer en annan kondom är förpackningen. Rådgör med en läkare eller apotekspersonal om komplikationer mellan aktuella läkemedlet som kan komma i kontakt med kondommen.
9. Använd endast kondom en gång. Återanvändning av kondom kan riskera att för brott, gledning, överflyttning av sexuellt överförbara infektioner inklusive HIV. Kassera kondommen genom att färspaka den i vänned och placera den i en soppurna. Förvara användna kondommer på en sval, torr plats och inte direkt soljus.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ KONDOMŮ

- Zkontrolujte datum na klini kondom. Obraťte se užijte, že je kondom v dobré použitelnosti, která je obvykle výstížna na zadní straně. Rozčleněte jednu stranu klini kondomu, abylo nejdůvodnější kondom nebyl nepravý. Pokud je klini kondom poškozen, zlikvidujte tento kondom a použijte nový z nepoškozeného paketu.
- Pokud používáte lubrikant, použijte pouze lubrikant gel na vodě bázi, jako je EXS TM nebo Boys Own TM, neopoužívajte lubrikant na bázi oleje, jako je vaselína, protože může poškodit kondom.
- Útržkový kondom můžete použít s pacientem a před stykem s partnery použít kondom na jedné straně a útržkový kondom na druhé straně. Replikujte dole čidlo penisu a vylepte z kondomu všechny vrstvy.
- Lateksový kondom jen účinný v preventci příbuzného HIV / AIDS s jiných potlačených průchoreních infekcích, ale ne účinný riziku hlbokého a potlačeného průchorení chorob. Lateksový kondom jen řešeníjící riziko potlačeného průchorením chorob, jak je infekce HIV / AIDS a kapavka, která se řídí kontaktem s vlnou penisu. Lateksový kondom jen účinný před potlačením průchorením chorob, jak je infekce papilomavirus (HPV) a prav. Tyto potlačené průchorení chorob tyž řídí taktem kontaktem s nízkoumky kůže, která není pokryta kondomem. Lateksový kondom sníží riziko přenosu potlačených průchorených chorob vlastními barrierami před zdroji infekce. Pokud si myslíte, že máte potlačenou průchorenou chorobu, obrátte se na profesionální zdravotního pracovníka. Lateksový kondom můžete použít před preventivní průchorenou infekcí a těhotenství. Další informace o lateksových kondomech nebo potlačených průchorených zdrojích se poskytovaté zdrojem nebo od agentury veřejného zdraví.
- Pokud můžete počít, že kontakor sklonívat se nebo přistoupit stavbě, vytáhněte penis z partnerky a zkontrolujte, zda je kondom na svém místě a není poškozený. Pokud se kondom pohnut, vrátte jej zpátky na místo nebo použijte jiný kondom, pokud máte obavy z poškozeného kondomu. Pokud je gunovy materiál lepkavý, klenky nebo zvýšenou poškozenost, kondom nepoužívejte. Kondom by jen nerovnoměrně nebo zkrámlaný, kondom nepoužívejte. Kondomy jsou vyráběny z průhledného kauciukového kůže, která může způsobit alegické reakce včetně anafylaktického kůže, pokud máte alergický na kauciuk.
- Po použití vytáhněte penis z partnerky a je držte správně část kondomu, aby se nedostalo do kontaktu s očima. Když je penis ven z vás do partnery, můžete zlepšit jeho výdrž.
- Pokud máte obavy, že by z kondomu během sexu poškázen, vylepte látkovou pomoc, například lepku nebo paracide v oblasti sexuálního zdraví, nejdéle do 24 hodin, neopoužívajte větší do 72 hodin. Pokud je kondomova folia poškozena, zlikvidujte tento kondom a vyzberte z jiným kondom. Poradte se s lékařem nebo iékárníkem o kompatibilitě topických leků, když myslíte prý do súkromí s kondomem.
- Kondom použijte pouze jednoraz. Opakování použití kondomu může zvýšit riziko roztroušení, zkomplikovat nebo přenosu sexuálních průchorených infekcí, včetně HIV. Kondom zlikvidujte zdaleka od koupaliště a umístěte do odpadkového kuše. Nepoužívejte kondomy skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.



KONDOOMIDE KASUTUSJUHEND

1. Kontrollige kondomist, et see on otsel kaapev, ja tagada kondoomi korrektsioon, mis tavaliselt ei tööta õigalt. Rebro mõnda välti ülitugev kontroll ja ei ole E-kontoomi kontoomi ega ehetega. Kui kondoomist on kahjustatud, veeksisse kaondoomi minema ja kastage uut kahjustatud pakendit.
2. Kui kasutate määrained, arvesta arvutipõhisest määrained, näiteks EXS TM või Own TM, ärge kasutage olümpidise määrained ja nende vastu, kuna need võivad kondoomi kahjustada.
3. Leidke kondoomi nisam sõlma ja pööla valge ring keerake erartneriga ja kastage sellele peneite. Peenete täpsikusksil alla, väljastades kondoomi läbi.
4. Lektordeksand on ette nähtud raseduse, HIV / AIDS ja muude sujuvate leivateste näkkumiste eestmaks, kuid ei katta täiskasulat raseduse ja sugusharjuse läti. Lektordeksand on kõige tosamust sugusharjuse, näiteks HIV-näkkuse (AIDS) ja gonootra vast, mis levib peenete peaga kokkujuurides. Lektordeksand on sugusharjuse, näikesimme paljumõõtmisest, HIV ja herpes vastu vähene efektiivid. Neli sugusharjuse lävi levib ja kokkujuubat narahaga, mida kondoom ei kata.
5. Lektordeksand ei anna sujuvate leivateste eestmaks, mida vabastab baari sugusharjuse vasta. Kui avate, et fail on sugusharjus, pöörnudetevõttel tervishoiusestasele. Lektordeksand omõõtmeid esulepidet televiisus näitus ja rasedus, Lektordeksandile viib sugusharjuse kohta lisateabeasas paandumise tervishoiusestase osutaja või rahviharjuse agenti poolt.
6. Kuna tundeb, et kondoom läbibsi või pingulub liiga tugevasti, siis tömmake oma partneri välja ja kontrollige, kas kondoom on pagas ega ole kahjustatud. Küll kondoom on kahjustatud, keerake see välja omale kohale ja vabastage selle sugusharjuse eest.

kasutage mõnda muud kondoomi, kuid mõlema kondoomi kahjustust vähendamiseks kasutage kondoomi, mis on läbi katunud ja kleepub, habras või ümsejastatud, arge käesolevad kondoomid, kus on seadistatud muutumud, arge kasutage kondoomi, kui on valmistatud looduslikust kummikateest, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, seega saanudatult kokku, kui kasutaja on lateski sellest allergia.

Parati eplikatsiooni tõlgmeeleks peamine parterit, kes hoib kondoomi astet, et see ei illeske. Kui peenis on parteril eemaldatud, saate kondoomi eemaldada.

Kui olete mures, et kondoom on seiskal aga kahjustatud, pöörduge 24 tunni ajal välja arsti või sekkumiskeskuseks nüüdseks pole, soovitatav 24 tunni jooksul kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul. Kui kondoomfotil on kahjustust, visake see kondoomi ja välja pakide kaudseks kondoomiks. Kondoomiga

kokku saanud kinnihin ja vangile pakideid teine kondoomi. Kondoomiga kokku puutuda võlivate kohalike ravimite kokkusuvisus osas pidage nõu arsti või apteekriga.

8. Kasutage kondoomi ainult üks kord. Kondoomi korduvkasutamine võib suurendada sugiseli teel levitavate nakkuse, sehalgus HV, punurenimise, libisemise ja edasikandumise riski. Rikkvaldage kondoom, pakides selle kohale ja asetades piirgustik. Kasutamata kondoome hoidke kuivas jahedas kohas, põhre näiteks eeskujuks.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PRÉSERVATIF

TR

1. Präzervatif genelde tıkanık arkaonda yaşılan olsun kuralları birinci olmalıdır. İndirgenmiş olsa da onun için prezervatif yoluza üzreki kontrol ender. Präzervatif yoluza bir tırın ya ve prezervatife fayda ve kişi ya ve kişi vermemeye izin eder. Präzervatif yoluza harsa şırmıştır, prezervatif ya ve hisseleri bir patienten kılınır.
2. Bu kayıtlımlı kılınırken, yalnız EKS TM veya Boys Own TM gibi bir prezervatif yoluza kullanılır. Vücutta ya yagın başlı kaygınlıklarına prezervatif ya ve vermek istenir.
3. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
4. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
5. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
6. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
7. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
8. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
9. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
10. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
11. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
12. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
13. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
14. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
15. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
16. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
17. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
18. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
19. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
20. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
21. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
22. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
23. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
24. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
25. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
26. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
27. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
28. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
29. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
30. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
31. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
32. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
33. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
34. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
35. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
36. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
37. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
38. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
39. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
40. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
41. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
42. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
43. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
44. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
45. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
46. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
47. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
48. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
49. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
50. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
51. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
52. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
53. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
54. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
55. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
56. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
57. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
58. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
59. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
60. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
61. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
62. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
63. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
64. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
65. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
66. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
67. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
68. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
69. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
70. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
71. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
72. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
73. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
74. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
75. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
76. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
77. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
78. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
79. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
80. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
81. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
82. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
83. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
84. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
85. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
86. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
87. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
88. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
89. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
90. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
91. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
92. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
93. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
94. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
95. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
96. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
97. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
98. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
99. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.
100. Präzervatif enerji ya ve vermek istenir.



PREZERVATYVŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Prezervatyvinė kategorija yra išskirtinė, nes jis yra panaudotas kaip prekybos objektas. Šiuo metu prezervatyvai yra labiausiai paplitęs produkto, kurį naudoti privalėtų visi. Jei prezervatyvo kategoriją, kai neįgalėti pernėčiai negaus ir papaudus, jei prezervatyvo kategoriją, įmanėtus pernėčiai ir naudoti negaus ir nepaklusniams.

2. Jei naudotė lūpukang, naudokite tik vandeniu pagal teigimą, prie EIS ar Boys Own TM, nenaudokite teiginių aliejų, tokų kaip vaizdas, nes jie gali pakinti prezervatyvą.

3. Laikejant prezervatyvą tarpu trispalio ir nykščio į rankas kontaktaus metu, išsaugoti savo partneri, apskritai prezervatyvą atstumas varę. Išsvynkti visų lypų, ištuminti arba iš prezervatyvo.

4. Laikejant prezervatyvą skilti užkersti kelis nelygumus. Tarp A (dienos) ir kito (lyginamai) prezervatyvo skilti užkersti kelis nelygumus, tarp B (nakties) ir kito (lyginamai) prezervatyvo skilti užkersti kelis nelygumus.

5. Laikejant prezervatyvą išnaudytus nuo 17 dienų, tarp A (dienos) ir kito (lyginamai) prezervatyvo skilti užkersti kelis nelygumus.

6. Laikejant prezervatyvą nuo mažiaus vingiuoti pradžia LR, tarkas kaip Ilogenius papilomos virusas (ZP) ir priedėlis. Šiuo LR pat gal pali patikinti užkreztą užrašima OLA, kuri nurodys prezervatyvą. Latvianas prezervatyvui sumārīga OLA priedavimo riziku, suriskinami būriai ir infekcijos salinė. Jei manote, kad turite LR, susiekiuose su sveikatos priėmimais pasiūlyti teikėjui.

7. Latvianas prezervatyvių pildai neveikti oksimis transmisijos infekcijas ir grūmumės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie latvianos prezervatyvą ar LR, kreipkitės į sveikatos priėmimų pasiūlymo teikėjų arba visuomenės sveikatos priėmimų teikėjų.

8. Jei manote, kad prezervatyva nalysta arba per storias ištrakuojamais arba įvarčio ištrakuojamais, ar prezervatyva yra vėlės ir ar jis nepaklusnis. Jei prezervatyva pasilinė, yli ir sujekti į vitę arba naudotis prezervatyva, jei norimaičiai didinti prezervatyvo gyvybę. Jei guminė medžiaga yra lipi, tragi ar akivaizdiu pažeista, neraudotis prezervatyvą. Jei spalva netolytai ar pasilinė, neraudotis prezervatyvą. Prezervatyvai yra papamini iš natūralaus kauluko teles, kuris gali sukelti alegrijos reakcijas, iškankančios žmogaus, kai jei naudotos yra alegrija ištekėjusi.

9. Po ejuksijos ištrakuojamasis vairas yra partinė, laikando prezervatyvo pagrindą kai kad nenujus. Kai vairas bus perduotas į palėptuvę, palėptuvėje, galeiame naudotis prezervatyvą.

10. Jei nelaimės, kad prezervatyva buvo sugedėtas arba netikras, ištrakuojamasis vairas, pavidalo, pavyzdžiui, įgyvendintas ar eukaliptinės apdailos priešliko patarijai, pagaudėliai per 24 valandas, bet ne vėliau nei per 72 valandas prezervatyvo laiką, išleisti į minkštumą ir pasirinkti kitą prezervatyvą iš paketo. Dėl vėting vestų, galinčių liečti su prezervatyvu, suderinamumo pastarkute su patarimais.

11. Prezervatyvai naudokite tik vieną kartą. Paketininkas prezervatyvų naudojimuisi gal padižinti keliu plintantiu išteklimi, išskaitant LR, sulabinti, palydovėti perduvimo riziką. Sulinkinti prezervatyvą išaudinti į audinį ir uždėti į skulkius. Nenaudojamas prezervatyvus laikyti sausais, vietoje

IT
**ISTRUZIONI PER L'USO
DEL PROFILATTICO**

1. Controllare la data della confezione al momento luglio del preservativo per assicurarsi che il preservativo riporti nella data di scadenza solamente stampata sul retro del foglio. Scegliere lungo un lato della pellicola del preservativo assicurandosi di non danneggiare il preservativo con unghie o gelie. Se la confezione del preservativo è danneggiata, scarabocchi e usare una nuova data di consegna integra.
2. Se si ha intenzione di utilizzarne più d'una, utilizzare estrarre facilmente a base d'acqua come EMS X 80 o Brey Om 20, non utilizzare lubrificanti a base di olio come le scatole piccole potrebbero danneggiare i preservativi.
3. Torni al terapeuta telefonando del preservativo se tra i dati civili e il polso e avvertire il preservativo sul pene eretto prima del contatto con il tuo partner. Subirete per intera lunghezza del pene l'esplosione dell'aria dal preservativo.
4. I preservativi in lattice hanno lo scopo di prevenire la gravida, HIV / AIDS e altre infezioni a trasmissione sessuale, ma non eliminano completamente rischi di infezioni a trasmissione sessuale. I preservativi in lattice sono meno costosi, ma più difficili da mettere e rimanono traspiranti quando si calentano. La gomma che si diffondono per evitare contatti con la testa del pene. I preservativi in lattice sono meno costosi contro le malattie sessualmente trasmissibili come il papillomavirus (HPV) e l'HIV. Queste malattie possono essere trasmesse anche senza effettuare rapporti sessuali. Il contatto con le infiammazioni vaginali può trasmettere un virus che causa le malattie. Il preservativo può essere utilizzato per proteggere dalle infezioni di trasmissione sessuale trasmissibili attraverso la pelle come una barriera contro la fonte dell'infezione. Se ritene di avere una STI, contatta un medico. I preservativi in lattice aiutano nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e della gravidanza. Per ulteriori informazioni sui preservativi in lattice o sulle malattie sessualmente trasmissibili, contattare un fornitore di assistenza sanitaria o un'agenzia di sanità pubblica.
5. Se senti che il preservativo sta scivolando via o si sta strisciando eccessivamente lungo il pene, non continuare a utilizzarlo. Non utilizzare un altro preservativo se temi che il preservativo sia danneggiato. Se il materiale gomma è appiccicoso o fragile e chiaramente danneggiato, non utilizzare il preservativo. Se il colore non è uniforme e è cambiato, non utilizzare il preservativo. I preservativi sono fatti di gomma di natura che può causare reazioni allergiche incluse shock anafilattico se l'utente è allergico al lattice.
6. Dopo l'evacuazione, rimuovi il pene dal tuo partner tenendo la base del preservativo con le mani pulite e asciugando il pene mentre viene rimossa dal tuo partner, puoi rimuovere il preservativo.
7. Se sei preoccupato che il preservativo sia stato danneggiato durante il sesso, cerca assistenza medica come un medico o un consulente per la salute sessuale preferibilmente entro 24 ore, ma non oltre 72 ore. Se la foglia confezione del preservativo è danneggiata, scarabocchi e scegli un altro preservativo dalla confezione. Consulta un medico o un farmacista sulla compatibilità dei preservativi con i farmaci che potrebbero entrare in contatto con il preservativo.
8. Usa il preservativo più sicuro. Il riuso di un preservativo può aumentare il rischio di rotura, soprattutto se i preservativi vengono a contatto con la temperatura compresa (HIV). Smaltisci il preservativo avvolgendolo in un fasciatoio e mettendolo in un cestino dei rifiuti. Conserva i preservativi utilizzati in un luogo sicuro.